

STICHTING  
**MATHEMATISCH CENTRUM**  
2e BOERHAAVESTRAAT 49  
**AMSTERDAM**  

---


**AFDELING MATHEMATISCHE STATISTIEK**

S 295

Syllabus van het Colloquium waarschijnlijkheidsrekening

. o.l.v. Prof.Dr. J.Th. Runnenburg

Hoofdstuk 3: Maattheoretische opbouw van de  
waarschijnlijkheidsrekening (p.164-204)



Printed at the Mathematical Centre at Amsterdam, 49, 2nd Boerhaavestraat.  
The Netherlands.

The Mathematical Centre, founded the 11th of February 1946, is a non-profit institution aiming at the promotion of pure mathematics and its applications, and is sponsored by the Netherlands Government through the Netherlands Organization for Pure Scientific Research (Z.W.O.) and the Central National Council for Applied Scientific Research in the Netherlands (T.N.O.), by the Municipality of Amsterdam and by several industries.

Errata bij S 295 (syllabus colloquium whr) hoofdstuk 3.

| blz. | regel        | staat:              | moet staan:              |
|------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 166  | 8 v.o.       | $K$                 | $\mathcal{K}$            |
| 167  | 17 v.b.      | $(\omega_0)$ voor   | $(\omega_0)\}$ voor      |
| 168  | 15 v.o.      | deelbaar            | meetbaar                 |
|      | 6 v.o.       | sommerbaar          | sommeerbaar              |
| 169  | 11 v.b.      | en                  | een                      |
|      | 12 v.o.      | kritirium           | kriterium                |
| 171  | 4 v.b.       | $dy_1$              | $dy_{m+1}$               |
| 175  | 1 v.o.       | $\int_R y \, dP' -$ | $\int_R y \, dP' =$      |
| 176  | 12 v.b.      | $\in B$             | $\in B\}$                |
|      | 14 v.b.      | $\leq c_2)$         | $\leq c_2\})$            |
|      | 5 v.o.       | is                  | $< \infty$ is            |
| 177  | 9 v.o.       | $f(\sum p_i x_i)$   | $f(\sum p_i x_i) \leq$   |
| 178  | 1 v.o.       | $k_1 \dots k_n$     | $\wedge_{k_1 \dots k_n}$ |
| 179  | 3 en 11 v.o. | Chebyshen           | Chebyshev                |
| 179  | 9 v.o.       | Bernouilli          | Bernoulli                |
| 180  | 4 v.b.       | Chebyshen           | Chebyshev                |
|      | 6 v.o.       | 0                   | $\geq 0$                 |
|      | 2 v.o.       | Chebysher           | Chebyshev                |

| blz. | regel   | staat:                                                                            | moet staan:                                               |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 182' | 5 v.o.  | systeem van                                                                       | systeem                                                   |
| 183' | 4 v.o.  | $\xi_{\omega}(\underline{x} \underline{y})$<br>$\omega \in \{\underline{y} = y\}$ | $\xi(\underline{x} \underline{y})$<br>$\underline{y} = y$ |
| 185' | 10 v.b. | $B_{\delta} = \{\omega\}$                                                         | $B_{\delta} = \{\omega\}$                                 |
| 187' | 15 v.o. | wordrn                                                                            | worden                                                    |
|      | 7 v.o.  | $\xi_{\omega}(\underline{x} \underline{y})$<br>$g(y(\omega))$                     | $\xi(\underline{x} \underline{y})$<br>$g(\underline{y})$  |
| 188' | 9 v.b.  | $\varphi(\underline{y} \in A')$                                                   | $\varphi(\underline{y} \in A')$                           |
|      | 9 v.o.  | $\xi(\underline{z} \underline{y})$                                                | $\xi(\underline{z} \underline{y})$                        |
| 192' | 1 v.b.  | Eatou                                                                             | Fatou                                                     |
| 194' | 14 v.o. | $\underline{x} \in I$ - b.o.                                                      | $\underline{x} \in I$ P - b.o.                            |
|      | 11 v.o. | sommeerbaar                                                                       | integreerbaar                                             |
|      | 9 v.o.  | $g(\xi(\underline{\cdot} \mathcal{B}))$                                           | $g(\xi(\underline{x} \mathcal{B}))$                       |
| 195' | 13 v.b. | $\underline{x}_n \{$                                                              | $\underline{x}_n = \{$                                    |
|      | 6 v.o.  | $a_n$ als                                                                         | $g(a_n)$ als                                              |
|      | 5 v.o.  | $x$ als                                                                           | $g(x)$ als                                                |
|      | 4 v.o.  | $b_n$ als                                                                         | $g(b_n)$ als                                              |
| 196' | 5 v.o.  | of                                                                                | op                                                        |
| 197' | 4 v.b.  | P                                                                                 | $P_{\omega}$                                              |
| 198' | 16 v.b. | $B_n$                                                                             | $B_{2n}$                                                  |

































































































